

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Datum měření: 10.5.2011	Jméno: Jakub Kákona
Pracovní skupina: 4	Ročník a kroužek: Pa 9:30
Spolupracovníci: Jana Navrátilová	Hodnocení:

Geometrická optika - Ohniskové vzdálenosti čoček a zvětšení optických přístrojů

Abstrakt

V úloze bylo použito několik metod měření ohniskových vzdáleností spojných čoček. Určili jsme ohniskovou vzdálenost rozptylky, Zkonstruovali jsme vlastní dalekohled a mikroskop. Změřili jsme zvětšení obou těchto přístrojů a porovnali s teoretickým výpočtem.

1 Úvod

Geometrická optika popisuje základní jevy při šíření světla a zanedbává jeho vlnové projevy. Proto nelze stejným způsobem popisovat i složitější děje, jako je polarizace či interference světla. V této úloze budeme proto zkoumat pouze základní optické elementy, jako jsou čočky a jejich soustavy.

1.1 Zadání

1. Určete ohniskovou vzdálenost tenké spojky následujícími metodami: odhadem, autokolimací, ze znalosti polohy předmětu a jeho obrazu (pro čtyři různé polohy předmětu; provést též graficky). Pokud jste se v Základech fyzikálních měření již s těmito metodami seznámili, je pro Vás tento úkol nepovinný.
2. Besselovou metodou určete ohniskovou vzdálenost tenké spojky. V přípravě odvod'te rovnici č.(8) a načrtněte chod paprsků v obou případech, kdy je vidět ostrý obraz. Proč je nutná podmínka $e > 4f$? Na čem závisí ohnisková vzdálenost čočky?
3. Určete ohniskovou vzdálenost tenké rozptylky.
4. Besselovou metodou změřte ohniskovou vzdálenost mikroskopického objektivu a Ramsdenova okuláru. V přípravě vysvětlíte rozdíl mezi Ramsdenovým a Huygensovým okulárem.
5. Abyste mohli určit optický interval mikroskopu v pracovním úkolu č. 7, určete nejprve polohy ohniskových rovin okuláru a objektivu. Rozmyslete si, zda potřebujete znát polohy jejich předmětových nebo obrazových ohniskových rovin.
6. Změřte zvětšení lupy při akomodaci oka na normální zrakovou vzdálenost. Stanovte z ohniskové vzdálenosti lupy zvětšení při oku akomodovaném na nekonečno.
7. Z mikroskopického objektivu a Ramsdenova okuláru sestavte na optické lavici mikroskop a změřte jeho zvětšení. Rozmyslete si, jak velký optický interval je vhodné zvolit.

8. Ze spojky +200 a Ramsdenova okuláru sestavte na optické lavici dalekohled a změřte jeho zvětšení přímou metodou a z poměru průměrů vstupní a výstupní pupily. V přípravě vysvětlete rozdíl mezi Galileovým a Keplerovým dalekohledem, načrtněte chod paprsků v obou případech.
9. Výsledky měření zvětšení mikroskopu a dalekohledu porovnejte s hodnotami vypočítanými z ohniskových vzdáleností a optického intervalu. Ohniskové vzdálenosti jste naměřili s určitou chybou, můžete proto spočítat i chybu vypočítaných zvětšení.

1.2 Teoretický úvod

Pro tenkou spojnou čočku platí v případě geometrické optiky čočková zobrazovací rovnice

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}, \quad (1)$$

obdobnou rovnici můžeme zapsat i pro rozptylku

$$\frac{1}{a'} - \frac{1}{a} = -\frac{1}{f}. \quad (2)$$

V obou případech je a i a' předmětová a obrazová vzdálenost.

Boční zvětšení je definováno vztahem

$$\beta = \frac{y'}{y}. \quad (3)$$

Kde y a y' jsou velikosti objektu a obrazu.

Pro měření Besselovou metodou použijeme výraz

$$f = \frac{e^2 - d^2}{4e}. \quad (4)$$

e je pak celková vzdálenost mezi předmětem a stínítkem a d je vzdálenost mezi polohami čočky v kterých bylo možné na stínítku pozorovat ostrý obraz.

Zvětšení okuláru je dáno vztahem

$$Z_2 = \frac{l}{f_2}. \quad (5)$$

Zvětšení mikroskopu spočteme vztahem

$$Z = Z_1 Z_2 = \frac{\Delta l}{f_1 f_2}, \quad (6)$$

Oboje je vztaženo k takzvané konvenční zrakové vzdálenosti, která je $l=25\text{cm}$.

2 Experimentální uspořádání a metody

2.1 Pomůcky

Optická lavice s jezdcí a držáky čoček, žárovka, mikroskopický objektiv, Ramsdenův okulár v držáku s Abbeho kostkou, spojně čočky +100, +200, rozptylka -100, matnice, clona s otvorem, clona se šipkou, pomocný světelný zdroj s milimetrovou stupnicí, objektivový mikrometr se stupnicí 100 x 0,01 mm, matnice se stupnicí 50 x 0,1 mm, pomocný mikroskop se stupnicí v zorném poli, pomocný dalekohled.

2.2 Ohnisková vzdálenost tenké spojky

2.2.1 Odhadem

Využijeme-li toho, že obraz dostatečně vzdáleného objektu vzniká přibližně v ohniskové rovině čočky. Jako přibližný odhad ohniskové vzdálenosti čočky pak bereme vzdálenost čočky od vzniklého obrazu.

2.2.2 Autokolimační metoda

V této metodě se využívá faktu, že paprsky bodového zdroje umístěného v ohnisky spojně čočky se lámou rovnoběžně. Po odrazu od rovinného zrcadla se vytvoří obraz. Je-li bodový zdroj realizovaný pomocí Malého kruhového otvoru, můžeme nepatrným vychýlením zrcátka docílit toho, že se zobrazí těsně vedle kruhového otvoru. Nyní stačí nastavit čočku do takové vzdálenosti, aby vznikl ostrý obraz (bod stejný, jako je velikost původního otvoru). Hledaná ohnisková vzdálenost pak odpovídá vzdálenosti čočky od kruhového otvoru.

2.2.3 Z polohy předmětu a jeho obrazu

Vyjdeme z čočkové rovnice

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}. \quad (7)$$

kde a, a' jsou vzdálenosti předmětu, resp. obrazu od čočky, f je ohnisková vzdálenost. Z 1 vyjádříme

$$f = \frac{aa'}{a + a'} \quad (8)$$

Tuto metodu lze modifikovat tak, že je možné ji řešit graficky.

2.2.4 Besselova metoda

Pokud máme spojnou čočku s ohniskovou vzdáleností f . A vzdálenost předmětu od stínítka e větší, než $4f$. Potom, je možné čočku umístit do dvou pozic mezi stínítko a předmět, tak aby na stínítku vznikl ostrý obraz. Pro ohniskovou vzdálenost čočky přitom platí:

$$f = \frac{e^2 - d^2}{4e}. \quad (9)$$

Pro ostrý obraz předmětu na stínítku platí vztah mezi vzdáleností předmětu a obrazu od čočky (a, a') vztah: $a + a' = e$. Vyjádřením $a' = e - a$ a dosazením do čočkové rovnice 1 dostaneme postupně

$$\frac{a' + a}{aa'} = \frac{1}{f} \quad \frac{e}{a(e - a)} = \frac{1}{f} \quad a^2 - ae + ef = 0. \quad (10)$$

Podle předpokladu $e > 4f$, a tedy má rovnice 4 právě dvě řešení, které tvoří hledanou dvojici poloh, při kterých vzniká na stínítku ostrý obraz. Pro vzdálenost obou kořenů platí vztah:

$$d = \frac{e + \sqrt{e^2 - 4ef}}{2} - \frac{e - \sqrt{e^2 - 4ef}}{2} \quad d = \sqrt{e^2 - 4ef}. \quad (11)$$

Vztah b dostaneme vyjádřením f .

2.2.5 Určení poloh ohniskových rovin tlustých čoček

Provedeme pomocí dalekohledu zaostřeného na nekonečno. Předmět se bude nacházet v ohniskové rovině čočky, když skrz čočku a dalekohled uvidíme ostrý obraz předmětu.

2.2.6 Stanovení ohniskové vzdálenosti tenké rozptylky

Měření ohniskové vzdálenosti rozptylky provedeme výpočtem ze znalosti polohy obrazu a předmětu. K měření ale musíme pomocnou spojkou nejprve vytvořit reálný obraz, jehož polohu je možné změřit. Z naměřených vzdáleností l_1, l_2, l_3 (vzdálenosti předmětu od spojky, od obrazu s rozptylkou a obrazu bez rozptylky) pak vypočteme a, a' . (Vzdálenosti obrazů od rozptylky) Ohniskovou vzdálenost pak získáme z čočkové rovnice pro rozptylku

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{a'} = -\frac{1}{f}. \quad (12)$$

3 Optické přístroje

3.1 Lupa

Lupa je jeden z nejjednodušších optických přístrojů. Úhlové zvětšení lupy je poměr mezi tan zorného úhlu u' , pod kterým vidíme předmět lupou k tangentě úhlu u , pod kterým pozorujeme předmět v tzv. *konvenční zrakové vzdálenosti* $l = 25 \text{ cm}$. Tj. lze psát

$$Z = \frac{\tan u'}{\tan u}. \quad (13)$$

- Při akomodaci oka na nekonečno: $Z_\infty = \frac{l}{f}$
- Při akomodaci oka na konvenční zrakovou vzdálenost: $Z_l = \frac{y'}{y}$, což je poměr mezi velikostí obrazu a předmětu.

3.2 Mikroskop

Mikroskop ve své základní konfiguraci je tvořen dvojicí čoček: objektivem a okulárem. Důležitou roli hraje vzájemná vzdálenost ohniskových rovin obou čoček, kterou nazýváme *optickým intervalem soustavy* a značíme Δ .

Celkové zvětšení mikroskopu je dáno vztahem

$$Z_{mik} = \frac{\Delta l}{f_1 f_2} \quad (14)$$

Zvětšuje se tedy s větší velikostí optického intervalu.

3.3 Dalekohled

Dalekohled slouží ke zvětšování zorného úhlu vzdálených předmětů. Konstrukce je podobná jako u mikroskopu, s tím rozdílem, že optický interval Δ je roven nule. Přístroj tedy příčně nezvětšuje.

Uhlové zvětšení dalekohledu je popsáno rovnicí

$$Z = \frac{f_1}{f_2}. \quad (15)$$

4 Výsledky a postup měření

4.1 Měření ohniskových vzdáleností čoček

4.1.1 Odhadem

Měřili jsme spojnou čočku označenou číslem +150. Její ohniskovou vzdálenost jsme určili odhadem vzdálenosti obrazu vzdálené lampy jako $13.50.5\text{cm}$.

4.1.2 Autokolimací

Ohnisková vzdálenost čočky +150 určená autokolimační metodou je 140.4cm . Chyba měření je odhadnuta s ohledem na tloušťku čočky a ostrost obrazu zobrazovaného otvoru.

4.1.3 Z polohy předmětu a obrazu

Změřili jsme tři různé polohy předmětu a jeho obrazu vzhledem k čočce +150 (v tabulce 1). Příslušné ohniskové vzdálenosti jsme vypočítali ze vztahu o.

#	a [cm]	a' [cm]	f [cm]
1	23.0	35.5	14.0 ± 0.1
2	30.0	26.5	14.1 ± 0.1
3	32.5	25.0	14.1 ± 0.1

Tabulka 1: Určení ohniskové vzdálenosti spojné čočky +150 z pozic vzoru a obrazu.

Celkový výsledek dostaneme jako aritmetický průměr hodnot; chybu odhadneme $\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$, kde σ_1 je chyba aritmetického průměru a σ_2 je chyba nepřímého měření. Ohnisková vzdálenost čočky +150 tedy vychází $f=14.10.1$

4.1.4 Besselova metoda

Touto metodou jsme změřili ohniskovou vzdálenost tenké spojky +200, Ramsdenova okuláru a mikroskopového objektivu. Nejprve jsme pozorovali čočkou +200 předmět vytvořený otvorem a promítaný na matnici. Výpočet chyby jsme provedli podle vzorce chyb nepřímých měření. Neurčitost vzdálenosti předmětu od stínítka jsme brali 1mm, neurčitost vzdálenosti dvou *ostrých* poloh 2mm.

d [cm]	e' [cm]	f [cm]
37.6	90.0	18.60.1
29.8	85.0	18.60.1
43.8	95.0	18.70.1

Tabulka 2: Besselova metoda, čočka +200.

Ohniskovou vzdálenost čočky +200 jsme tedy stanovili na $18.60.1\text{cm}$.

U ostatních elementů v důsledku toho, že ohnisková vzdálenost mikroskopového objektivu a Ramsdenova okuláru je poměrně malá, pozorovali jsme obraz pomocným mikroskopem. výsledky měření jsou v tabulce 3.

Ohnisková vzdálenost mikroskopového objektivu vychází $2.380.05\text{cm}$, Ramsdenova okuláru $2.970.04\text{cm}$.

mikroskopový objektiv			Ramsdenův okulár		
d [cm]	e' [cm]	f [cm]	d [cm]	e' [cm]	f [cm]
3.40	10.5	2.36 ± 0.05	2.65	12.5	2.99 ± 0.04
4.10	11.0	2.38 ± 0.05	7.60	15.5	2.95 ± 0.04
2.45	10.0	2.36 ± 0.05	2.90	12.5	2.96 ± 0.04

Tabulka 3: Besselova metoda; mikroskopový objektiv, Ramsdenův okulár

4.1.5 Ohnisková vzdálenost rozptylky

Měřená rozptylka byla označena číslem -100, pomocná spojka byla použita čočka +100. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4. Ohnisková vzdálenost rozptylky vychází 10.00.5cm.

l_1 cm	l_2 cm	l_3 cm	a cm	a' cm	f cm
47.8	40.0	71.0	7.8	31.0	10.4 ± 0.4
46.7	42.0	51.0	4.7	9.0	9.8 ± 0.9
47.7	42.0	55.6	5.7	13.6	9.8 ± 0.6

Tabulka 4: Měření ohniskové vzdálenosti tenké rozptylky

4.2 Polohy ohniskových rovin

Změřili jsme polohy ohniskové roviny Ramsdenova okuláru a mikroskopového objektivu. Vždy jsme měřili *vnitřní* rovinu; tu, která se normálně nachází uvnitř přístroje a je zapotřebí pro určení optického intervalu. Vzdálenost jsme odečítali od konce osazení součástky.

Vzdálenost ohniskové roviny Ramsdenova okuláru od jeho kraje:	0.530.05cm.
Vzdálenost ohniskové roviny mikroskopového objektivu od jeho kraje:	1.040.05cm.

4.3 Zvětšení lupy

Měření zvětšení lupy jsme provedli přímou metodou měřením poměru dvou stupnic zobrazených na sebe pomocí Abbeho kostky. Tím jsme určili zvětšení lupy na hodnotu $8,8 \pm 0,3$. Z námi změřené ohniskové vzdálenosti okuláru který byl použitý, jako lupa vyplývá ze vzorce hodnota zvětšení při akomodaci oka na nekonečno 8,42x.

4.4 Zvětšení mikroskopu

Obdobným způsobem (pomocí zobrazované a referenční stupnice) jsme určili i zvětšení námi postaveného mikroskopu. Použitý optický interval měl velikost 14.30.1cm. Změřené zvětšení má hodnotu $Z_l = 50 \pm 1$. Teoretická zvětšení by podle vzorce mm mělo být $Z_{teor} = 51 \pm 2$.

4.5 Zvětšení dalekohledu

Dále jsme měřili zvětšení dalekohledu. Pozorovali jsme stupnici ve vzdálenosti přibližně 9 m skrz dalekohled a zároveň (pomocí Abbeho kostky přes zrcátko) přímo (tj nezvětšenou). Získané zvětšení dalekohledu je $Z = 6.7 \pm 0.2$. Teoretická hodnota vychází $Z_{teor} = 6.4 \pm 0.1$.

přístroj	změřené zvětšení [-]	teoretické zvětšení [-]
lupa, akomodace na l	$Z_l = 8.8 \pm 0.3$	
lupa, akomodace na ∞		$Z_\infty = 8.42 \pm 0.02$
mikroskop	$Z_l = 50 \pm 1$	$Z_{teor} = 51 \pm 2$
dalekohled	$Z = 6.7 \pm 0.2$	$Z_{teor} = 6.4 \pm 0.1$

Tabulka 5: Zvětšení optických přístrojů.

5 Diskuze

5.1 Určování ohniskových vzdáleností čoček

Jako velice přesná metoda se ukázala být metoda Besselova. Výhodou této metody je, že není třeba znát geometrický střed zkoumaného elementu, který se obtížně určuje; stačí změřit vzdálenost *ostrých* poloh čočky. Nevýhodou je komplikovanější výpočet. Dobré výsledky dává i autokolimační metoda, která umožňuje dobře určit i absolutní pozici ohniskové roviny vzhledem k čočce.

Poněkud méně přesné bylo měření rozptylky. Je to dáno tím, že ohniskovou vzdálenost rozptylky nelze měřit tak jednoduše, jako u spojky. Složitější uspořádání s větším množstvím vad pak vneslo do výsledku další chyby.

Přesnost všech našich měření byla obecně snížena vadami typickými pro reálné čočky, zejména *barevnou vadou* (používali jsme bílé světlo) a *sférickou vadou* (zobrazený předmět nebyl bod).

5.2 Zvětšení optických přístrojů

Změřené zvětšení mikroskopu se dobře shoduje s teoretickou hodnotou. V případě dalekohledu vychází jeho zvětšení poněkud větší, než teoreticky vypočítaná hodnota. Výsledek mohla ovlivnit některá zobrazovací vada. Při výpočtu se také předpokládá, že je oko umístěno hned u okuláru, což v praxi nebylo možné, neboť před okulárem byla ještě Abbeho kostka.

6 Závěr

Několika metodami jsme určili ohniskovou vzdálenost tenké spojky +150, odhadem, autokolimační a Besselovou metodou. Dále jsme za použití pomocné čočky určili ohniskovou vzdálenost rozptylky -100. Zkoumali jsme také zvětšení základních optických přístrojů, jako lupa, mikroskop a dalekohled.

Reference

- [1] <http://praktika.fjfi.cvut.cz/GeomOptika/> -Zadání úlohy